

Casirivimab und Imdevimab

Hinweise zur Zwischenlagerung

Casirivimab 1332 mg und Imdevimab 1332 mg Durchstechflaschen

- Durchstechflaschen sind bis zum Gebrauch im Kühlschrank bei 2°C bis 8°C zu lagern.
- Durchstechflaschen im Umkarton aufbewahren, um das Arzneimittel vor Licht zu schützen.
- Das Arzneimittel darf NICHT EINFRIEREN und NICHT GESCHÜTTELT werden.

Die Casirivimab und Imdevimab-Durchstechflaschen sollten **vor der Zubereitung** aus dem Kühlschrank entnommen und **etwa 20 Minuten auf Raumtemperatur** gebracht werden (nicht direkter Hitze aussetzen!).

Die zubereitete Infusion ist unmittelbar anzuwenden und darf nicht gelagert werden.

Bitte vollständig ausfüllen – dient als Herstellungsdocumentation!

Name Patient:	
Verwendetes Fertigarzneimittel:	Casirivimab 1332 mg pro 11 ml (120 mg/ml) und Imdevimab 1332 mg pro 11 ml (120 mg/ml) Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung mit je 1200 mg Casirivimab und Imdevimab
Chargenbezeichnung:	
Zubereitungsdatum und Uhrzeit:	
Zubereitender (Name, Unterschrift):	
Verabreichungsdatum und Uhrzeit:	
Verordnender / freigebender Arzt (Name, Unterschrift):	
Anmerkung	Bitte machen Sie sich vor der Zubereitung mit der Fachinformation von Casirivimab und Imdevimab vertraut!

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Herstellung sorgfältig durch!

Benötigtes Material:

- 1x Casirivimab 1332 mg (120 mg/ml)
- 1x Imdevimab 1332 mg (120 mg/ml)
- 1x NaCl 0,9%-Beutel 250 ml
- 2x Spritze 10 ml
- 2x Kanüle (18G)
- 1x Infusionsbesteck
- 1x Inline-Filter

**Hinweise zur Zubereitung**

1. Prüfen Sie die Ampullen visuell auf Partikel und Verfärbungen. Die Lösung ist klar bis leicht opaleszent und farblos bis blassgelb.
2. Fläschchen vorsichtig per Hand schwenken. **Nicht schütteln!**
3. Entfernen Sie die Verschlusskappe am **weißen** Injektionsport des NaCl-Beutels.
4. Desinfizieren Sie den Gummistopfen der Vials (Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten!).
5. Ziehen Sie mit zwei separaten Spritzen **10 ml Casirivimab** und **10 ml Imdevimab** auf (**Cave: Druckausgleich! Schaumbildung vermeiden!**) und spritzen beides langsam durch die gelbe Membran in den 250 ml NaCl 0,9% -Beutel.
6. Wenden Sie den Beutel vorsichtig, um ihn zu mischen. **Nicht schütteln!**
7. Schließen Sie das Infusionsbesteck nach Entfernen der transparenten Verschlusskappe an den Infusionsport des Beutels an.
8. Verabreichen Sie die verdünnte Lösung als intravenöse Infusion **über den beigepackten 0,2 µm-Inline-Filter** mit einer **Infusionsrate von 540 ml/h** über **mind. 30 Minuten**. Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Füllschwankungen der vorgefüllten Infusionsbeutel u.U. nicht exakt die deklarierte Menge enthalten ist.
Der Beutel sollte in jedem Fall komplett durchlaufen.
9. Spülen Sie anschließend die Infusionsleitung mit mind. 25-50 ml NaCl 0,9% um zu verhindern, dass relevante Wirkstoffmengen in der Infusionsleitung verbleiben.

gemäß SPC Casirivimab und Imdevimab: Stand Juni 2021

Dateiname: KH-MIN Zubereitungsanleitung Casirivimab und Imdevimab COVID-19 Antikörper (02-0)	Seite: 2 von 2
Ersteller: Schütze (Apotheker), Freidank (QMB)	Erstelldatum: 18.03.2022
Freigabe: Radziwill (Direktor)	Freigabedatum: 30.03.2021